



CELEBRATING
10
YEARS

Rx a Novel Therapy

Pregabid NT^{50/75}

Pregabalin 50/75 mg + Nortriptyline 10 mg Tabs.
More pain-free moments in life

This Movement is supported by:

ALECTA INTAS
The makers of

Pregabid NT^{50/75}
Pregabalin 50/75 mg + Nortriptyline 10 mg Tabs.

Pregabid D
Pregabalin 300 mg + Nortriptyline 10 mg Tabs.

Pregabid Trio
Pregabalin 300 mg + Nortriptyline 10 mg + Clonazepam 0.5 mg

Pregabid CR
Pregabalin 300 mg + Nortriptyline 10 mg + Clonazepam 0.5 mg



પીઠની નીચેની ભાગમાં દુખાવા સાથે સારું
જવન જળવી રાખવાને લગતો સૂચનો

પીઠની નીચેના ભાગમાં દુખાવો

પ્રસાર

લો બેક પેઇન (એલબીપી) એક એવી લાક્ષણિક સ્થિતિ છે કે જેમાં કરોડરજાની નીચેના ભાગમાં દુખાવો થાય છે, તે અવાર-નવાર એક બાજુ અથવા બજે બાજુએ નિતંબ અને જંધની બાજુ થાય છે. માનવીમાં એલબીપીએ ખૂબ જ સામાન્ય લક્ષણ છે અને તે ઉમરની સાથે તેમાં આ સ્થિતિ બનતી જોવા મળે છે. એપિડેમિઓલોજીકલના અંકડા દરશાવી છે કે આશરે ૮૦-૯૫ ટકા વસ્તીને ઓછામાં ઓછા એક વખત તેમના જીવનમાં કરોડરજાની નીચેના ભાગમાં દુખાવો, પીડાની સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે.

લક્ષણો

લક્ષણના પ્રકાર અને દુખાવાની તીવ્રતા વિવિધ દર્દી પર આધાર રાખે છે. સામાન્ય લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે:

- નીચેના ભાગમાં બમણી સ્થિતિમાં દુખાવો થતો રહે છે
- આ દુખાવો નિતંબ, જંધ અને પગમાં થતો હોય છે.
- લાંબા સમય સુધી બેસી રહેવાથી આ દુખાવાની સ્થિતિ સર્જયાં છે.
- જ્યારે ફેરફાર થાય છે ત્યારે આ દુખાવાનો વધુ સારી રીતે અહેસાસ થાય છે.
- ચોક્કસ સ્થિતિમાં દુખાવો, જે ચાલ્યા બાદ અને વધારે હલન-ચલન કર્યા બાદ દુખાવાની સ્થિતિ વધારે ગંભીર બને છે.



શું કરવું

&

શું ન કરવું

કાર્ય સ્થળ

- ▶ ખુરશીમાં પાઇણની બાજુ ટેકો આપીને યોગ્ય રીતે બેસવું
- ▶ જોવાની સ્થિતિ ઉપરની બાજુએ અંખના સ્તરની સમાંતર હોવી જોઈએ.

શું ન કરવું

- ▶ એકદમ બેસી ન જાઓ અથવા ઉભા આપીને યોગ્ય રીતે બેસવું
- ▶ વાંચવા માટે આગળની બાજુએ અંખના સ્તરની સમાંતર હોઈ જાઓ.

સતત બેસવું અને ચાલવું :

- ▶ ઉચ્ચી એડીના બૂટ કે પગરખા પહેરવાનું ટાળો; એવા બૂટ કે પગરખાનો આગ્રહ રાખો કે જે નીચી છિલવાળા હોય અને પહેરવામાં સાનુષૂણ હોય. જ્યારે પણ જરૂર જણાય ત્યારે તમારી સ્થિતિને યોગ્ય કરો.

ઉભા રહેવું અને ચાલવું :

- ▶ એક જ સ્થિતિમાં લાંબા સમય સુધી ઉભા રહેશો નહીં. કોઈ અયોગ્ય સ્થિતિમાં ચાલવાનો આગ્રહ રાખશો નહીં.

ઉંઘવું :

- ▶ જ્યારે તમારી ચોક્કસ બાજુ આડા પડ્યા હોય ત્યારે તમારી કોણીને વાળો અને ઓશીકા અને તમારી વધ્યે રાખો.
- ▶ ગાંદલાને ટેકો આપીને તમારી પીઠને કુદરતી વળાંક સાથે ટેકો આપો.

ઉંઘવું :

- ▶ વધ્યે સુવાળા, યોગ્ય ટેકો ન મળી શકે તેવા ગાંદલામાં કે ઓશીકા સાથે ઉંઘવાનો આગ્રહ રાખશો નહીં.
- ▶ તમારા પેટ પર ભાર આપીને ઉંઘશો નહીં.

વ्यायाम

શારીરિક વ्यાયામ એ તમારા આરોગ્ય અને સુખાકારી માટે અગત્યનો છે. નિયમિતપણે લો બેક પાઈનની સ્થિતિમાં ભોજનના યોગ્ય આયોજન, જસ્તી દવાઓ લઈને અને તણાવની સ્થિતિના સંચાલન સાથે વ્યાયમ કરવો તે ચાવીસુધ્રાં અગત્યતા ધરાવે છે.

પીઠની નીચે દુખાવાની સ્થિતિમાં વ્યાયામ કરવા માટેના સૂચનો

ચોપગા સ્થિતિમાં ટકાર રહેવું

ચોપગા પોઝિશનમાં પગને પાછળની બાજુએ રાખીને ટકાર બેસવાનો આગ્રાહ રાખો. આ સ્થિતિમાં કેટલાક સનાયુએ કરોડરજજાની નીચેના ભાગમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં ટેકો આપે છે. આ ફોટોમાં દર્શાવવામાં આવેલ તે પ્રમાણે સુખાલ અથવા ફિટનેસ બેન્ડની મદદથી પણ સ્ટ્રેચ રહેવાના લાભો મેળવી શકાય છે.



- ▶ ચોપગા ટકાર રહેવા સાથે વ્યાયામ કરવા નીચેના પગલાંનું પાલન કરો:
- ▶ સૌ પ્રથમ તમારી એક ધૂંટણને વાળીને પાણણના ભાગમાં લેટી જાઓ.
- ▶ ત્યારબાદ વાળવામાં ન આવેલા પગ પર એક બોલ આકારમાં સુખાલનો ટેકો આપવો.
- ▶ ધીમે ધીમે આ સુખાલને બેંચો, તમારી ધૂંટણને સીધી કરતા જાઓ. જામારા પગની પાછળની બાજુ સાથે કેટલીક તંગ સ્થિતિનો તમને અનુભવ થશે.
- ▶ ઓછામાં ઓછી ૧૫-૩૦ સેકન્ડ માટે આ સ્થિતિને જાળવી રાખો.
- ▶ દરેક પગ માટે આ સ્થિતિનું પંખત પુરનાવર્તન કરતા રહો.

દિવાળ સ્થિતિમાં બેસવું

જ્યારે પીઠની પાછળના ભાગમાં દુખાવો થાય ત્યારે કેટલીક દિવાલના ટેકાથી તે પ્રયત્ન કરો, એક સ્થિતિમાં બેઠા બાદ થોડો આરામ કરો.

તે દિવાલની સહાયતાથી યોગ્ય રીતે બેસો અને કોઈ ઈજ ન પહોંચે તેની કાળજી રાખીને નીચેના પગલાંને અનુસરો:

- ▶ પાછળની બાજુ ચહેરો રાખીને બેસો અને દિવાલથી આશરે ૧૦થી ૧૨ ઈંચનું અંતર રાખો.
- ▶ જ્યાં સુધી તમારું કરોડરજજુ એક સમાંતર સ્થિતિમાં ન રહે ત્યાં સુધી તમારે આ સ્થિતિનું અધ્યયન કરતી વખતે વિશેષ કાળજી રાખવી.
- ▶ જ્યાં સુધી ધૂંટણ થોડા પ્રમાણમાં વળલા ન હોય ત્યારે ધીમે ધીમે નીચે તરફ વળવું. તમારી જાતને પાછળની બાજુ દિવાલ તરફ વળીને દબાવવાનું જાળવી રાખો.
- ▶ આ સ્થિતિને ૧૦ ગણતરી કરવા સુધી જાળવી રાખો, બાદમાં ધીમે ધીમે મૂળ સ્થિતિ તરફ આવો. આ રીતે ૮થી ૧૨ વખત કરી શકાય છે.

